



ONCE-DAILY

INGREZZA®
(valbenazine) capsules

¿Los movimientos involuntarios,
lo hacen sentir

desconectado?

Podría ser discinesia tardía (DT).

Consulte a su proveedor de atención
médica sobre cómo reducir los
movimientos por DT con las cápsulas
de INGREZZA® (valbenazine).



Puede encontrar
más información en
[INGREZZA.com/TD](https://www.ingrezza.com/TD)

Representación actuarial



Información importante

Uso aprobado

Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) o de INGREZZA® SPRINKLE (valbenazine) son medicamentos de venta con receta que se utilizan para tratar a adultos con movimientos en la cara, la lengua u otras partes del cuerpo que no se pueden controlar (discinesia tardía).

Se desconoce si INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE son seguros y eficaces en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, que incluyen: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos, en el estado de ánimo, las conductas, los pensamientos o los sentimientos. Esto es especialmente importante cuando se empieza con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o la conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la **[Información de prescripción](#)** que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la **[Guía del medicamento](#)**.

Discinesia tardía: Movimientos corporales persistentes e involuntarios

Si tiene movimientos persistentes e involuntarios y está tomando determinados medicamentos para la salud mental, es hora de preguntarle a su proveedor de atención médica sobre una afección tratable llamada discinesia tardía (DT).

Los movimientos por la DT pueden producirse en cualquier parte del cuerpo:

PARTE SUPERIOR DEL CUERPO

BRAZOS, TORSO, MANOS/DEDOS

PARTE INFERIOR DEL CUERPO

PIERNAS, PIES/DEDOS DE LOS PIES



ROSTRO

BOCA, LABIOS, LENGUA, MANDÍBULA, OJOS

Dé un paso importante:

Comprenda la causa de sus movimientos involuntarios y aprenda sobre el tratamiento.

Visite [INGREZZA.com/Movements](https://www.ingrezza.com/Movements)

¿Qué medicamentos pueden causar DT?

Es posible que le hayan recetado determinados medicamentos para la salud mental (antipsicóticos) para tratar una de estas afecciones:

Depresión

Esquizofrenia/trastorno esquizoafectivo

Trastorno bipolar

Trastorno de ansiedad

Determinados medicamentos recetados utilizados para tratar trastornos gastrointestinales (metoclopramida y proclorperazina) también pueden causar DT.

Si actualmente está tomando antipsicóticos, no interrumpa, ajuste ni cambie su medicamento sin hablar con su proveedor de atención médica.

Vea una lista de medicamentos que se sabe que causan DT en

[INGREZZA.com/Meds-to-Monitor](https://www.ingrezza.com/Meds-to-Monitor)

Información de seguridad importante seleccionada

No tome INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si:

- es alérgico a la valbenazine o a alguno de los componentes de INGREZZA o de INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-DAILY
INGREZZA[®]
(valbenazine) capsules

Vivir con discinesia tardía

Es poco probable que la DT mejore por sí sola, pero puede tomar el control hablando con su proveedor de atención médica de inmediato.

Incluso los movimientos leves por DT pueden afectar negativamente su trabajo, las salidas sociales y las actividades diarias.* Los movimientos involuntarios pueden crear una impresión no deseada en las personas que conoce.

Estos movimientos también pueden afectar su bienestar emocional.*



“Debido a mi DT, me avergonzaba estar en público. Masticaba mucho chicle para ocultar el movimiento de mis mandíbulas. No asistía a sesiones de trabajo, reuniones familiares. Me perdí muchos acontecimientos porque me excluía”.

– Steve, vive con trastorno bipolar y discinesia tardía

Steve fue compensado por Neurocrine Biosciences, Inc. por compartir su historia



Vea historias de pacientes reales en
[INGREZZA.com/Stories](https://www.ingrezza.com/Stories)

¿Lo está afectando la DT? Consulte a su proveedor de atención médica sobre la reducción de los movimientos involuntarios con las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine). Es un tratamiento que ha demostrado reducir la DT con siempre una cápsula, una vez al día y la n.º 1 más recetada.

*En una encuesta, se preguntó a 127 personas diagnosticadas con DT: “La DT puede afectarlo de muchas formas diferentes. ¿En qué medida lo ha afectado la DT en cada una de las siguientes áreas?”. Las respuestas se basaron en una escala de 1 (nada afectado) a 7 (muy afectado).

Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas.** Las reacciones alérgicas, incluida una reacción alérgica que causa una inflamación repentina denominada angioedema, pueden ocurrir después de tomar la primera dosis o después de muchas dosis de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas y el angioedema incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, hinchazón de la cara, los labios, los párpados, la lengua o la garganta, u otras áreas de la piel, problemas para tragar o erupción cutánea, incluidas zonas enrojecidas elevadas en la piel (ronchas) que pican. La hinchazón de la garganta puede ser potencialmente mortal y provocar la muerte. Deje de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta estos signos y síntomas de reacciones alérgicas y angioedema.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).



ONCE-DAILY
INGREZZA®
(valbenazine) capsules

Cuidar a alguien con discinesia tardía

Puede ser difícil decirle a un ser querido que usted ha notado que tiene movimientos involuntarios. Pero cuanto más pronto lo sepa, más rápido podrá tomar el control hablando con un proveedor de atención médica sobre el diagnóstico y el tratamiento.



“Me alegro de haberle dicho algo a Amy sobre sus movimientos involuntarios, porque aunque los estuviera haciendo, no tenía ni idea de que los estaba haciendo. Si no lo hubiésemos analizado, nunca hubiésemos llegado a donde estamos ahora, ni nos hubiéramos enterado de INGREZZA”.

– Kim (derecha), cuidadora de Amy, que vive con depresión y DT

Amy y Kim fueron compensadas por Neurocrine Biosciences, Inc. por compartir sus historias

“Si tiene movimientos involuntarios y ha tenido antecedentes de tomar medicamentos para problemas de salud mental, es posible que tenga DT. Consulte a su médico y abogue por usted mismo. Hay tratamientos”.

– Forrest (derecha), cuidador de Moira, que vive con depresión y DT

Moira y Forrest fueron compensadas por Neurocrine Biosciences, Inc. por compartir sus historias



Si su ser querido tiene movimientos involuntarios, es posible que necesite su apoyo. Está bien expresarse. Alíente los a hablar con un proveedor de atención médica sobre la DT.

Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Somnolencia y cansancio que podrían causar tiempos de reacción lentos (somnolencia y sedación).** No conduzca un automóvil ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo lo afectan INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Beber alcohol y tomar otros medicamentos también puede causar somnolencia durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-DAILY
INGREZZA[®]
(valbenazine) capsules

Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).**
INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar un problema de ritmo cardíaco conocido como prolongación del intervalo QT. Tiene una mayor probabilidad de tener prolongación del intervalo QT si también toma determinados medicamentos durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas de prolongación del intervalo QT, que incluyen: latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares (palpitaciones cardíacas), falta de aire, mareos o vahídos, desmayos o sensación de desmayo.
- **Síndrome neuroléptico maligno (NMS).** El NMS es una afección grave que puede provocar la muerte. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la sala de emergencias más cercana si presenta estos síntomas y no tienen otra causa obvia: fiebre alta, músculos rígidos, problemas para pensar, pulso o presión arterial irregulares, aumento de la sudoración o latidos cardíacos muy rápidos o irregulares.
- **Síntomas similares al Parkinson.** Los síntomas incluyen: rigidez corporal, babeo, problemas para moverse o caminar o para mantener el equilibrio, sacudidas (temblores) o caídas.

Tratar la DT con INGREZZA



Se ha comprobado que INGREZZA reduce la DT con **siempre una cápsula, una vez al día y la n.º 1 más recetada.**

Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) se usan para tratar adultos con DT en la cara, la lengua u otras partes del cuerpo. Se desconoce si INGREZZA es seguro y eficaz en niños.

Reducción de la DT

LOGRAR LA REMISIÓN

Sin movimientos o movimientos mínimos
a las **48 SEMANAS** en el 59 % de las personas*

FUNCIONA RÁPIDAMENTE

>5 veces Reducción de la DT a las
2 SEMANAS en comparación con el placebo†

MEJORA SIGNIFICATIVA‡

>10 veces Reducción de la DT a las
6 SEMANAS en comparación con el placebo†

*En una evaluación del estudio posclínico del ensayo KINECT 4, el 59 % (61/103) de las personas que completaron el ensayo que tomaron INGREZZA (40 mg y 80 mg) alcanzaron un puntaje de 1 o menos para cada parte del cuerpo medida con AIMS en la semana 48. Los resultados son de naturaleza descriptiva.

†Reducciones basadas en el cambio promedio desde el inicio hasta la semana 2 en una escala de gravedad del movimiento involuntario. Resultados para INGREZZA 80 mg -1.9 (n = 77) frente a placebo -0.3 (n = 76) en un estudio clínico.

‡INGREZZA se estudió en un ensayo clínico de 6 semanas. Un total de 234 personas participaron en el estudio. Los resultados se basaron en 79 personas que tomaron la dosis recomendada de 80 mg.

§Reducciones basadas en el cambio promedio desde el inicio hasta la semana 6 en una escala de gravedad del movimiento involuntario. Resultados para INGREZZA 80 mg -3.2 (n = 70) frente a placebo -0.1 (n = 69) en un estudio clínico.

Información de seguridad importante seleccionada

Antes de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene problemas hepáticos o cardíacos, está embarazada o planea quedarse embarazada, o está en periodo de lactancia o planea amamantar.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).



ONCE-DAILY
INGREZZA®
(valbenazine) capsules



Representación actuarial

Satisfacción duradera

en personas que toman
INGREZZA durante ~2 años*



*55 de 56 pacientes en un estudio de extensión de pacientes que recibieron INGREZZA durante 48 semanas después de completar los estudios KINECT 3 y KINECT 4 a largo plazo. Basado en el Cuestionario de satisfacción del paciente administrado a los pacientes al comienzo y al final del tratamiento.

Información de seguridad importante seleccionada

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Asegúrese de informar a todos sus proveedores de atención médica que está tomando INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE junto con determinados medicamentos puede causar efectos secundarios graves. Informe especialmente a su proveedor de atención médica si: toma digoxina o toma o ha tomado un medicamento inhibidor de la monoaminoxidasa (MAOI). No debe tomar INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si está tomando, o ha dejado de tomar, un MAOI en los últimos 14 días.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-DAILY
INGREZZA[®]
(valbenazine) capsules

Administración sencilla de INGREZZA

INGREZZA facilita la administración desde el principio



Comienza en una dosis eficaz



También disponible en formulación para espolvorear



Siempre una cápsula, una vez al día




Tomada en cualquier momento



Con o sin alimentos



Se puede agregar a los regímenes de salud mental más estables



No es el tamaño real

Representación actuarial

Información de seguridad importante seleccionada

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con discinesia tardía son somnolencia y cansancio.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).



No es el tamaño real

Las cápsulas de INGREZZA e INGREZZA® SPRINKLE (valbenazine) están disponible en 3 concentraciones de dosis efectivas. La dosis recomendada de INGREZZA es de 80 mg.

Su proveedor de atención médica comenzará con 40 mg durante 1 semana y es posible que lo mantenga con la dosis de 40 mg o cambie a 60 mg u 80 mg, según sus necesidades de tratamiento.



¿Tiene problemas para tragar píldoras?

Hay otra forma de tomar INGREZZA

Obtenga información sobre INGREZZA SPRINKLE en [INGREZZA.com/TD-Sprinkle](https://www.ingrezza.com/TD-Sprinkle)

Tome INGREZZA exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.

Su proveedor de atención médica le dirá qué dosis de INGREZZA® (valbenazine) debe tomar y cuándo hacerlo.

- INGREZZA se puede tomar con o sin alimentos
- No deje de tomar INGREZZA sin antes hablar con su proveedor de atención médica
- Si toma demasiada cantidad de INGREZZA, llame al centro de toxicología al 1-800-222-1222

Información de seguridad importante seleccionada

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).



ONCE-DAILY
INGREZZA®
(valbenazine) capsules

Con INGREZZA, puede seguir **tomando** la mayoría de los medicamentos de salud mental

En un estudio clínico, el estado psiquiátrico permaneció estable en general en las personas que tomaron las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine), incluidas aquellas que también tomaron medicamentos para:



- Depresión
- Trastorno bipolar
- Esquizofrenia/trastorno esquizoafectivo
- Trastorno de ansiedad

No deje de tomar INGREZZA sin antes hablar con su proveedor de atención médica.



“Tomo INGREZZA una vez al día, se ajusta a mi rutina. Mis movimientos por DT están bajo control con INGREZZA”.

Los resultados pueden variar de acuerdo con la persona.

– Moira, vive con depresión y discinesia tardía

Neurocrine Biosciences, Inc. compensó a Moira por compartir su historia

Información de seguridad importante seleccionada

Formas de dosificación y concentración: INGREZZA e INGREZZA SPRINKLE están disponibles en cápsulas de 40 mg, 60 mg y 80 mg.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-DAILY
INGREZZA[®]
(valbenazine) capsules



Representación actuarial

Las personas que toman INGREZZA para la DT pueden seguir con su dosis actual de la mayoría de los medicamentos para la salud mental.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, que incluyen:



- Medicamentos recetados
- Medicamentos de venta libre
- Vitaminas
- Suplementos a base de hierbas

Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, que incluyen: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos, en el estado de ánimo, las conductas, los pensamientos o los sentimientos. Esto es especialmente importante cuando se empieza con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o la conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-DAILY
INGREZZA[®]
(valbenazine) capsules

Tomar el control

**Ha trabajado mucho para mejorar su salud mental.
No deje que los movimientos involuntarios lo frenen.**

Ya sea que sus movimientos corporales involuntarios sean leves, moderados o graves, es importante conectarse con un psiquiatra, neurólogo o proveedor de atención médica que tenga experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de la DT.



Representación actoral

Información de seguridad importante seleccionada

No tome INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si:

- es alérgico a la valbenazina o a alguno de los componentes de INGREZZA o de INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).



Representación actuarial

Tomar el control comienza por preguntarle a su proveedor de atención médica sobre un tratamiento para sus movimientos involuntarios. Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) son un tratamiento que ha demostrado reducir la DT, que siempre es una cápsula, una vez al día y la n.º 1 más recetada.



¿Necesita ayuda para iniciar la conversación sobre DT?

Descargue nuestra Guía de análisis con el médico en [INGREZZA.com/discussionguide](https://www.ingrezza.com/discussionguide)



Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas.** Las reacciones alérgicas, incluida una reacción alérgica que causa una inflamación repentina denominada angioedema, pueden ocurrir después de tomar la primera dosis o después de muchas dosis de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas y el angioedema incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, hinchazón de la cara, los labios, los párpados, la lengua o la garganta, u otras áreas de la piel, problemas para tragar o erupción cutánea, incluidas zonas enrojecidas elevadas en la piel (ronchas) que pican. La hinchazón de la garganta puede ser potencialmente mortal y provocar la muerte. Deje de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta estos signos y síntomas de reacciones alérgicas y angioedema.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).



Efectos secundarios frecuentes de INGREZZA

Los efectos secundarios más frecuentes de las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) o de las cápsulas de INGREZZA® SPRINKLE (valbenazine) en personas con discinesia tardía son somnolencia y cansancio.

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, que incluyen: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas.

¿Qué debo hacer si experimento efectos secundarios?

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.



EmpowerING



Representación actoral

Mucho implica ser el tratamiento para la DT n.º 1 más recetado:

- 27 estudios clínicos con más de 1470 personas
- 7 años de experiencia en el mundo real
- Más de 1 millón de recetas totales desde 2017
- 3 opciones de dosificación simples y eficaces
- Comienza con una dosis eficaz



Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Somnolencia y cansancio que podrían causar tiempos de reacción lentos (somnolencia y sedación). No conduzca un automóvil ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo lo afectan INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Beber alcohol y tomar otros medicamentos también puede causar somnolencia durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-DAILY
INGREZZA®
(valbenazine) capsules

Dedicado a **ayudarle** en su experiencia con el tratamiento

El Programa de apoyo INBRACE® está diseñado para ayudar a los pacientes a quienes se les receta INGREZZA® (valbenazine) en cápsulas a través de una variedad de programas de asistencia financiera.



Tarjeta de descuento en copagos

Si es elegible, se puede aplicar automáticamente una tarjeta de ahorros en la farmacia, lo que puede ayudarle a ahorrar dinero en su receta de INGREZZA.*

*Esta oferta es válida solo para pacientes que tienen un seguro comercial (no financiado por el gobierno). Se aplican términos y condiciones adicionales.

INGREZZA está disponible a través de una red seleccionada de farmacias especializadas y afiliadas locales. Una farmacia especializada proporciona medicamentos que generalmente no están disponibles en su farmacia minorista local.

Una vez que se haya autorizado la cobertura, INGREZZA se le enviará directamente por correo urgente.

Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).** INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar un problema de ritmo cardíaco conocido como prolongación del intervalo QT. Tiene una mayor probabilidad de tener prolongación del intervalo QT si también toma determinados medicamentos durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas de prolongación del intervalo QT, que incluyen: latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares (palpitaciones cardíacas), falta de aire, mareos o vahídos, desmayos o sensación de desmayo.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).



ONCE-DAILY
INGREZZA®
(valbenazine) capsules

Programa de inicio de INGREZZA

El Programa de inicio de INGREZZA es una prueba gratuita (suministro para un mes) de INGREZZA disponible para pacientes nuevos.* Su proveedor de atención médica puede inscribirlo en el Programa de inicio de INGREZZA descargando el formulario de inscripción del sitio web de INBRACE y enviando el formulario completado en su nombre.

Programa de Asistencia para Pacientes de INGREZZA

Si no tiene cobertura para medicamentos recetados para INGREZZA y carece de recursos financieros para pagar el medicamento, es posible que pueda recibir su receta sin costo alguno a través del Programa de asistencia al paciente de INGREZZA.† Su proveedor de atención médica puede ayudarlo a solicitar el programa o llame al 1-84-INGREZZA para obtener más información.

*Este programa no está supeditado a una compra de ningún tipo. El producto entregado en virtud de este programa de prueba gratuito no puede presentarse para reembolso a ningún tercero pagador. Nos reservamos el derecho de modificar o cancelar el programa en cualquier momento.

†Se aplican términos y condiciones adicionales.

**Para obtener más información sobre el Programa de apoyo INBRACE®,
llame al 1-84-INGREZZA (1-844-647-3992)
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este, de lunes a viernes,
o visite [INGREZZA.com/Support](https://www.ingrezza.com/support)**

Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Síndrome neuroléptico maligno (NMS).**

El NMS es una afección grave que puede provocar la muerte. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la sala de emergencias más cercana si presenta estos síntomas y no tienen otra causa obvia: fiebre alta, músculos rígidos, problemas para pensar, pulso o presión arterial irregulares, aumento de la sudoración o latidos cardíacos muy rápidos o irregulares.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).



ONCE-DAILY
INGREZZA®
(valbenazine) capsules

Información importante

Usos aprobados

Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) o de INGREZZA® SPRINKLE (valbenazine) son medicamentos de venta con receta que se utilizan para tratar a adultos con:

- movimientos en el rostro, la lengua u otras partes del cuerpo que no pueden controlarse (discinesia tardía).
- los movimientos involuntarios (corea) de la enfermedad de Huntington. INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE no curan la causa de los movimientos involuntarios y no tratan otros síntomas de la enfermedad de Huntington, como los problemas con el pensamiento o las emociones.

Se desconoce si INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE son seguros y eficaces en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, que incluyen: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos, en el estado de ánimo, las conductas, los pensamientos o los sentimientos. Esto es especialmente importante cuando se empieza con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o la conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

No tome INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si:

- es alérgico a la valbenazine o a alguno de los componentes de INGREZZA o de INGREZZA SPRINKLE.

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas.** Las reacciones alérgicas, incluida una reacción alérgica que causa una inflamación repentina denominada angioedema, pueden ocurrir después de tomar la primera dosis o después de muchas dosis de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas y el angioedema incluyen: dificultad para respirar o falta de aire, hinchazón de la cara, los labios, los párpados, la lengua o la garganta, u otras áreas de la piel, problemas para tragar o erupción cutánea, incluidas zonas enrojecidas elevadas en la piel (ronchas) que pican. La hinchazón de la garganta puede ser potencialmente mortal y provocar la muerte. Deje de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE y acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta estos signos y síntomas de reacciones alérgicas y angioedema.
- **Somnolencia y cansancio que podrían causar tiempos de reacción lentos (somnolencia y sedación).** No conduzca un automóvil ni opere maquinaria peligrosa hasta que sepa cómo lo afectan INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Beber alcohol y tomar otros medicamentos también puede causar somnolencia durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE.

- **Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).** INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar un problema de ritmo cardíaco conocido como prolongación del intervalo QT. Tiene una mayor probabilidad de tener prolongación del intervalo QT si también toma determinados medicamentos durante el tratamiento con INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas de prolongación del intervalo QT, que incluyen: latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares (palpitaciones cardíacas), falta de aire, mareos o vahídos, desmayos o sensación de desmayo.
- **Síndrome neuroléptico maligno (NMS).** El NMS es una afección grave que puede provocar la muerte. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la sala de emergencias más cercana si presenta estos síntomas y no tienen otra causa obvia: fiebre alta, músculos rígidos, problemas para pensar, pulso o presión arterial irregulares, aumento de la sudoración o latidos cardíacos muy rápidos o irregulares.
- **Síntomas similares al Parkinson.** Los síntomas incluyen: rigidez corporal, babeo, problemas para moverse o caminar, o para mantener el equilibrio, sacudidas (temblores) o caídas.

Antes de tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene problemas hepáticos o cardíacos, está embarazada o planea quedarse embarazada, o está en periodo de lactancia o planea amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Asegúrese de informar a todos sus proveedores de atención médica que está tomando INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Tomar INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE junto con determinados medicamentos puede causar efectos secundarios graves. Informe especialmente a su proveedor de atención médica si: toma digoxina o toma o ha tomado un medicamento inhibidor de la monoaminoxidasa (MAOI). No debe tomar INGREZZA ni INGREZZA SPRINKLE si está tomando, o ha dejado de tomar, un MAOI en los últimos 14 días.

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con discinesia tardía son somnolencia y cansancio.

Los efectos secundarios más frecuentes de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE en personas con corea asociada con la enfermedad de Huntington incluyen somnolencia y cansancio que podrían causar tiempos de reacción lentos, zonas enrojecidas elevadas con picazón en la piel (ronchas), erupción cutánea y problemas para dormirse o permanecer dormido.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE. Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.

Formas de dosificación y concentración: INGREZZA e INGREZZA SPRINKLE están disponibles en cápsulas de 40 mg, 60 mg y 80 mg.



Representación actoral

Tratar sus movimientos debido a la DT



Se ha demostrado que las cápsulas de **INGREZZA**[®] (valbenazine) reducen la DT, siempre una cápsula, una vez al día y la n.º 1 más recetada.



Las personas que toman **INGREZZA** pueden seguir con su dosis actual de la mayoría de los medicamentos para la salud mental.



Comienza en una dosis eficaz.



Tome el control: comience por preguntarle a su proveedor de atención médica sobre **INGREZZA.**

Escanee el código QR o visite [INGREZZA.com/TD](https://www.ingrezza.com/TD) para obtener más información sobre el tratamiento.

Información de seguridad importante seleccionada

INGREZZA o INGREZZA SPRINKLE pueden causar efectos secundarios graves en personas con enfermedad de Huntington, que incluyen: depresión, pensamientos suicidas o acciones suicidas. Informe a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar **INGREZZA** o **INGREZZA SPRINKLE** si tiene enfermedad de Huntington y está deprimido (tiene depresión no tratada o depresión que no está bien controlada con medicamentos) o tiene pensamientos suicidas. Preste mucha atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos, en el estado de ánimo, las conductas, los pensamientos o los sentimientos. Esto es especialmente importante cuando se empieza con **INGREZZA** o **INGREZZA SPRINKLE** y cuando se cambia la dosis. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si se deprime, tiene cambios inusuales en el estado de ánimo o la conducta, o tiene pensamientos de hacerse daño.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18–19 y la [Información de prescripción](#) que se adjunta, incluidos el recuadro de advertencia y la [Guía del medicamento](#).